



Manzanilla

CULTIVO	CANTIDAD POR APLICACIÓN (POR HECTÁREA)		APLICACIÓN TOTAL POR TEMPORADA (POR HECTÁREA)	MÉTODO DE APLICACIÓN	APLICACIÓN POR TEMPORADA	% esperado incremento
	# 1	200 ml				
Manzanilla	# 1	200 ml	1.5 litros	Directo al follaje y tierra	Sembrar y después cada 15 días	21%
	Siguientes	100 ml				

DILUYA EN LA CANTIDAD USUAL DE RIEGO POR CADA HECTÁREA.

LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN

- Enjuague el equipo a utilizar antes y después de la aplicación.
- * Silgo debe diluirse en la cantidad típica de agua utilizada por hectárea.
- Agite bien antes de usar.
- Silgo debe diluirse en agua limpia antes de la aplicación.
- Para obtener mejores resultados, aplique durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde.
- Silgo NO debe aplicarse simultáneamente, o mezclarse con fertilizantes, fungicidas, insecticidas o cualquier otro tipo de producto agrícola.
- Cuando aplique fertilizantes, aplique Silgo de 48 a 72 horas antes de aplicar el fertilizante. Cuando se realiza la poda, debe seguir una aplicación de Silgo para obtener mayores beneficios.
- La solución de Silgo en agua debe aplicarse 1 hora después de su mezcla y usarse dentro de las 72 horas posteriores a la dilución
- No devuelva el material diluido al contenedor principal de Silgo.

Siempre pruebe Silgo, primero en un área pequeña.

Lea las instrucciones en la etiqueta del envase antes de usar.

Se recomienda en lo posible aplicación foliar abundante de manera que el producto alcance los suelos.